

## Calendrier de vaccination recommandé pour les adultes (avec un facteur de risque supplémentaire ou une autre indication) par groupe d'âge, États-Unis, 2022

Vaccin	19-26 ans	27-49 ans	50-64 ans	65 ans et plus
Influenza inactivé (IIV4) OU Influenza recombiné (RIV4)	1 dose par an			
Tétanos, diphtérie, coqueluche (Tdap ou Td)	1 dose de Tdap à chaque grossesse ; 1 dose de Td/Tdap pour le traitement des plaies (parlez-en au prestataire)	1 dose de Tdap à chaque grossesse ; 1 dose de Td/Tdap pour le traitement des plaies (parlez-en au prestataire)	1 dose de Tdap à chaque grossesse ; 1 dose de Td/Tdap pour le traitement des plaies (parlez-en au prestataire)	1 dose de Tdap à chaque grossesse ; 1 dose de Td/Tdap pour le traitement des plaies (parlez-en au prestataire)
Varicelle (VAR)	2 doses (si vous êtes né en 1980 ou après)	2 doses (si vous êtes né en 1980 ou après)	2 doses	2 doses
Zoster recombinant (RZV)	2 doses en cas d'immunodépression (à définir avec le prestataire)	2 doses en cas d'immunodépression (à définir avec le prestataire)	2 doses	2 doses
Pneumococcique (PCV15, PCV20, PPSV23)	1 dose de PCV15 suivie du PPSV23 OU 1 dose de PCV20 (à définir avec le prestataire)	1 dose de PCV15 suivie du PPSV23 OU 1 dose de PCV20 (à définir avec le prestataire)	1 dose de PCV15 suivie du PPSV23 OU 1 dose de PCV20 (à définir avec le prestataire)	1 dose de PCV15 suivie du PPSV23 OU 1 dose de PCV20 (à définir avec le prestataire)
Hépatite A (HepA)	2 ou 3 doses selon le vaccin			
Hépatite B (HepB)	2, 3 ou 4 doses selon le vaccin ou l'état de santé	2, 3 ou 4 doses selon le vaccin ou l'état de santé	2, 3 ou 4 doses selon le vaccin ou l'état de santé	2, 3 ou 4 doses selon le vaccin ou l'état de santé
Méningocoque A, C, W, Y (MenACWY)	1 ou 2 doses selon l'indication, voir les notes pour les recommandations de rappel	1 ou 2 doses selon l'indication, voir les notes pour les recommandations de rappel	1 ou 2 doses selon l'indication, voir les notes pour les recommandations de rappel	1 ou 2 doses selon l'indication, voir les notes pour les recommandations de rappel
Méningocoque B (MenB)	2 ou 3 doses selon le vaccin et l'indication, voir les notes pour les recommandations de rappel	2 ou 3 doses selon le vaccin et l'indication, voir les notes pour les recommandations de rappel	2 ou 3 doses selon le vaccin et l'indication, voir les notes pour les recommandations de rappel	2 ou 3 doses selon le vaccin et l'indication, voir les notes pour les recommandations de rappel
Haemophilus influenzae type b (Hib)	1 ou 3 doses selon l'indication			

La vaccination contre le COVID-19 est recommandée pour les personnes âgées de 5 ans et plus. Une personne est à jour de ses vaccinations contre le COVID-19 lorsqu'elle a reçu toutes les doses recommandées du vaccin contre le COVID-19, y compris la ou les doses de rappel, le cas échéant.

