

Esquema de Inmunización Recomendado para Adultos (con un factor de riesgo adicional o alguna otra indicación) según la Categoría de Edad, Estados Unidos, 2022

Vacuna	19-26 años	27-49 años	50-64 años	65+ años
Influenza inactivada (IIV4) O Influenza recombinante (RIV4)	1 dosis anual	1 dosis anual	1 dosis anual	1 dosis anual
Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap o Td)	1 dosis de Tdap en cada embarazo; 1 dosis de Td/Tdap para tratamiento de heridas (hablar con el proveedor)	1 dosis de Tdap en cada embarazo; 1 dosis de Td/Tdap para tratamiento de heridas (hablar con el proveedor)	1 dosis de Tdap en cada embarazo; 1 dosis de Td/Tdap para tratamiento de heridas (hablar con el proveedor)	1 dosis de Tdap en cada embarazo; 1 dosis de Td/Tdap para tratamiento de heridas (hablar con el proveedor)
Varicela (VAR)	2 dosis (si nació en 1980 o después)	2 dosis (si nació en 1980 o después)	2 dosis	2 dosis
Herpes zóster recombinante (RZV)	2 dosis para padecimientos que traen inmunodeficiencia (hablar con el proveedor)	2 dosis para padecimientos que traen inmunodeficiencia (hablar con el proveedor)	2 dosis	2 dosis
Neumocócica (PCV15, PCV20, PPSV23)	1 dosis de PCV15 seguida de PPSV23 O 1 dosis de PCV20 (hablar con el proveedor)	1 dosis de PCV15 seguida de PPSV23 O 1 dosis de PCV20 (hablar con el proveedor)	1 dosis de PCV15 seguida de PPSV23 O 1 dosis de PCV20 (hablar con el proveedor)	1 dosis de PCV15 seguida de PPSV23 O 1 dosis de PCV20 (hablar con el proveedor)
Hepatitis A (HepA)	2 o 3 dosis, dependiendo de la vacuna	2 o 3 dosis, dependiendo de la vacuna	2 o 3 dosis, dependiendo de la vacuna	2 o 3 dosis, dependiendo de la vacuna
Hepatitis B (HepB)	2, 3 o 4 dosis, dependiendo de la vacuna o del padecimiento	2, 3 o 4 dosis, dependiendo de la vacuna o del padecimiento	2, 3 o 4 dosis, dependiendo de la vacuna o del padecimiento	2, 3 o 4 dosis, dependiendo de la vacuna o del padecimiento
Meningocócica A, C, W, Y (MenACWY)	1 o 2 dosis, dependiendo de las instrucciones, ver las notas respecto a las recomendaciones de la dosis de refuerzo	1 o 2 dosis, dependiendo de las instrucciones, ver las notas respecto a las recomendaciones de la dosis de refuerzo	1 o 2 dosis, dependiendo de las instrucciones, ver las notas respecto a las recomendaciones de la dosis de refuerzo	1 o 2 dosis, dependiendo de las instrucciones, ver las notas respecto a las recomendaciones de la dosis de refuerzo
Meningocócica B (MenB)	2 o 3 dosis, dependiendo de la vacuna y de las instrucciones, ver las notas respecto a las recomendaciones de la dosis de refuerzo	2 o 3 dosis, dependiendo de la vacuna y de las instrucciones, ver las notas respecto a las recomendaciones de la dosis de refuerzo	2 o 3 dosis, dependiendo de la vacuna y de las instrucciones, ver las notas respecto a las recomendaciones de la dosis de refuerzo	2 o 3 dosis, dependiendo de la vacuna y de las instrucciones, ver las notas respecto a las recomendaciones de la dosis de refuerzo
Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	1 o 3 dosis, dependiendo de las instrucciones	1 o 3 dosis, dependiendo de las instrucciones	1 o 3 dosis, dependiendo de las instrucciones	1 o 3 dosis, dependiendo de las instrucciones

La vacuna contra el COVID-19 se recomienda para las edades de 5 años y más. Una persona está al día con las vacunas contra el COVID-19 una vez que ha recibido todas las dosis recomendadas de la vacuna contra el COVID-19, incluyendo cualquier dosis de refuerzo cuando reúna los requisitos para recibirla.

