

Esquema de Inmunización Recomendado para Adultos según la Categoría de Edad, Estados Unidos, 2022

Vacuna	19-26 años	27-49 años	50-64 años	65+ años
Influenza inactivada (IIV4) O Influenza recombinante (RIV4)	1 dosis anual	1 dosis anual	1 dosis anual	1 dosis anual
Influenza viva atenuada (LAIV4)	1 dosis anual	1 dosis anual	Ver recomendaciones para personas con factores de riesgo	Ver recomendaciones para personas con factores de riesgo
Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap o Td)	1 dosis de Tdap y después una dosis de refuerzo de Td o de Tdap cada 10 años	1 dosis de Tdap y después una dosis de refuerzo de Td o de Tdap cada 10 años	1 dosis de Tdap y después una dosis de refuerzo de Td o de Tdap cada 10 años	1 dosis de Tdap y después una dosis de refuerzo de Td o de Tdap cada 10 años
Sarampión, paperas, rubeola (MMR)	1 o 2 dosis, dependiendo de las instrucciones (si nació en 1957 o después)	1 o 2 dosis, dependiendo de las instrucciones (si nació en 1957 o después)	1 o 2 dosis, dependiendo de las instrucciones (si nació en 1957 o después)	
Varicela (VAR)	2 dosis (si nació en 1980 o después)	2 dosis (si nació en 1980 o después)	Ninguna evidencia de inmunidad = 2 dosis	Ninguna evidencia de inmunidad = 2 dosis
Zóster recombinante (RZV)			2 dosis	2 dosis
Virus del papiloma humano (HPV)	2 o 3 dosis, dependiendo de la edad en el momento de la vacunación inicial o del padecimiento	De los 27 a los 45 años		
Neumocócica (PCV15, PCV20, PPSV23)	Ver recomendaciones para personas con factores de riesgo	Ver recomendaciones para personas con factores de riesgo	Ver recomendaciones para personas con factores de riesgo	1 dosis de PCV15 seguida de PPSV23 O 1 dosis de PCV20
Hepatitis B (HepB)	2, 3 o 4 dosis, dependiendo de la vacuna o del padecimiento	2, 3 o 4 dosis, dependiendo de la vacuna o del padecimiento	2, 3 o 4 dosis, dependiendo de la vacuna o del padecimiento	
Meningocócica B (MenB)	De los 19 a los 23 años			

La vacuna contra el COVID-19 se recomienda para las edades de 5 años y más. Una persona está al día con las vacunas contra el COVID-19 una vez que ha recibido todas las dosis recomendadas de la vacuna contra el COVID-19, incluyendo cualquier dosis de refuerzo cuando reúna los requisitos para recibirla.

