



VACCIN CONTRE LE COVID-19 ET RAPPELS

Pfizer

Moderna

Johnson & Johnson (J&J)

Âges recommandés	5 ans et plus	18 ans et plus	18 ans et plus
Série principale	2 doses Administré à 3 semaines (21 jours) d'intervalle.	2 doses Administré à 4 semaines (28 jours) d'intervalle.	1 dose
Dose de rappel	Dose de rappel au moins 5 mois après la dernière dose de la série principale.	Vous devez recevoir une dose de rappel au moins 5 mois après la dernière dose de la série principale.	Vous devez recevoir une dose de rappel de Pfizer-BioNTech ou Moderna (vaccins contre le COVID-19 à ARNm) au moins 2 mois après la première dose du vaccin contre le COVID-19 de J&J/Janssen.
Quand suis-je « à jour » ?	2 doses de la série principale depuis moins de 5 mois OU rappel 5 mois après la fin de la série principale.	2 doses de la série principale depuis moins de 5 mois OU rappel 5 mois après la fin de la série principale.	1 doses de la série principale depuis moins de 2 mois OU rappel 2 mois après la fin de la série principale.
Quand suis-je « à jour » si je suis modérément ou gravement immunodéprimé ?	Série de 2 doses depuis moins de 28 jours ; ou 1 dose supplémentaire (3e dose pour compléter la série principale) depuis moins de 3 mois ; ou rappel (4e dose) 3 mois après la fin de la série principale de 3 doses.	Série de 2 doses depuis moins de 28 jours ; ou 1 dose supplémentaire (3e dose pour compléter la série principale) depuis moins de 3 mois ; ou Rappel (4e dose) 3 mois après la fin de la série principale de 3 doses.	1 dose de la série principale il y a moins de 28 jours ; 1 dose supplémentaire (2e dose, Moderna ou Pfizer) il y a moins de 2 mois ; dose de rappel 2 mois après la deuxième dose, de préférence avec Moderna ou Pfizer (3 doses au total).
2ème dose de rappel	12 ans et plus immunodéprimé 50 ans et plus	18 ans et plus immunodéprimé 50 ans et plus	Peuvent recevoir un vaccin à ARNm uniquement ; 18 ans et plus immunodéprimés ; 18-49 ans ayant reçu un vaccin principal et un vaccin de rappel J&J ; 50 ans et plus