



# VACUNA Y DOSIS DE REFUERZO CONTRA EL COVID-19

## Pfizer

## Moderna

## Johnson & Johnson (J&J)

Edades recomendadas	5 años o más	18 años o más	18 años o más
<b>Serie primaria</b>	2 dosis Administradas con 3 semanas (21 días) de diferencia entre sí.	2 dosis Administradas con 4 semanas (28 días) de diferencia entre sí.	1 dosis
<b>Dosis de refuerzo</b>	Usted debería ponerse una dosis de refuerzo después de transcurridos al menos 5 meses desde su última dosis de la serie primaria.	Usted debería ponerse una dosis de refuerzo después de transcurridos al menos 5 meses desde su última dosis de la serie primaria.	Usted debería ponerse una dosis de refuerzo de Pfizer-BioNTech o de Moderna (vacunas ARNm contra el COVID-19) después de transcurridos al menos 2 meses desde la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 J&J/Janssen.
<b>¿Cuándo "estoy al día"?</b>	Serie primaria de 2 dosis hace menos de 5 meses; O dosis de refuerzo 5 meses después de completar la serie primaria.	Serie primaria de 2 dosis hace menos de 5 meses; O dosis de refuerzo 5 meses después de completar la serie primaria.	Serie primaria de 1 dosis hace menos de 2 meses; O dosis de refuerzo después de transcurridos 2 meses desde que completó la serie primaria.
<b>¿Cuándo "estoy al día" como persona moderada o gravemente inmunodeprimida?</b>	Serie primaria de 2 dosis hace menos de 28 días; O 1 dosis adicional (3.ª dosis para completar la serie primaria) hace menos de 3 meses; O dosis de refuerzo (4.ª dosis) 3 meses después de completar la serie primaria de 3 dosis.	Serie primaria de 2 dosis hace menos de 28 días; O 1 dosis adicional (3.ª dosis para completar la serie primaria) hace menos de 3 meses; O dosis de refuerzo (4.ª dosis) 3 meses después de completar la serie primaria de 3 dosis.	Serie primaria de 1 dosis hace menos de 28 días; 1 dosis adicional (2.ª dosis, Moderna o Pfizer) hace menos de 2 meses; Dosis de refuerzo a los 2 meses de haberse puesto la segunda dosis preferiblemente de Moderna o de Pfizer (3 dosis en total).
<b>2.ª dosis de refuerzo</b>	<b>12 años o más inmunodeprimidos</b> <b>50 años o más</b>	<b>18 años o más inmunodeprimidos</b> <b>50 años o más</b>	<b>Puede</b> recibir mRNA solamente; 18 años o más e inmunodeprimido(a); 18-49 años que ha recibido una serie primaria y una dosis de refuerzo J&J; 50 años o más.