

# Esquema Pediátrico de Inmunización Recomendado según la Categoría de Edad, Estados Unidos, 2022

Vacuna	Al nacer (en las primeras 24 horas)	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	15 meses	18 meses	19-23 meses	4-6 años	7-10 años	11-12 años	13-15 años	16-18 años
Hepatitis B (HepB)	1 dosis	1 dosis	1 dosis (1)	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis						
Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP /Tdap)		1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis (2)	1 dosis (2)	1 dosis (2)		1 dosis		1 dosis (Tdap)		
Haemophilus influenzae tipo b (Hib)		1 dosis	1 dosis	1 dosis (1)	1 dosis	1 dosis							
Polio (IPV)		1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis		1 dosis				
Neumocócica conjugada (PCV13)		1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis							
Rotavirus (RV)		1 dosis	1 dosis	1 dosis (1)									
Sarampión, paperas, rubeola (MMR)					1 dosis	1 dosis			1 dosis				
Varicela (VAR)					1 dosis	1 dosis			1 dosis				
Hepatitis A (HepA)					2 dosis (6)	2 dosis (6)	2 dosis (6)	2 dosis (6)	2 dosis (6)	2 dosis (6)	2 dosis (6)	2 dosis (6)	2 dosis (6)
Virus del papiloma humano (HPV)											2 dosis (3)		
Meningocócica A, C, W, Y (MenACWY)											1 dosis		1 dosis
Meningocócica B (Men B)													2 dosis (4,5)
Influenza (Flu)				1 dosis (7)	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis

**La vacuna contra el COVID-19 se recomienda para las edades de 5 años y más.**

**Hable con el proveedor de atención médica de su niño(a) sobre las vacunas recomendadas para su edad.**

**Notas:**

1. Puede que su niño(a) no necesite esta dosis, dependiendo de la marca de vacuna que su proveedor de atención médica usa.
2. Esta dosis de DTaP se puede administrar ya a partir de los 12 meses si ya han pasado 6 meses desde la dosis anterior.
3. Los niños que tengan ciertos padecimientos médicos necesitarán una tercera dosis.
4. Esta vacuna se le puede administrar a adolescentes sanos. También se recomienda para adolescentes con ciertos padecimientos médicos.
5. Puede que su adolescente necesite una dosis adicional, dependiendo de las recomendaciones del proveedor.
6. 2 dosis administradas con 6 meses de diferencia entre sí, normalmente entre los 12-23 meses. La vacuna HepA (2 dosis) se recomienda también en el caso de los niños y adolescentes que no se han vacunado antes.
7. Una dosis todos los otoños o inviernos a todas las personas con 6 meses o más de edad. Algunos niños menores de 9 años necesitan 2 dosis; pregúntele al proveedor de atención médica de su niño(a) si este(esta) necesita más de 1 dosis.

