

2022 年美国按年龄组推荐的儿童免疫接种时间表

疫苗	出生时(24 小时内)	2 个月	4 个月	6 个月	12 个月	15 个月	18 个月	19-23 个月	4-6 岁	7-10 岁	11-12 岁	13-15 岁	16-18 岁
乙型肝炎 (HepB)	1 剂	1 剂	1 剂量 (1)	1 剂	1 剂	1 剂	1 剂						
白喉、破伤风、百日咳 (DTaP/Tdap)		1 剂	1 剂	1 剂	1 剂 (2)	1 剂 (2)	1 剂 (2)		1 剂		1 剂 (Tdap)		
b 型流感嗜血杆菌 (Hib)		1 剂	1 剂	1 剂 (1)	1 剂	1 剂							
脊髓灰质炎 (IPV)		1 剂	1 剂	1 剂	1 剂	1 剂	1 剂		1 剂				
肺炎球菌结合物 (PCV13)		1 剂	1 剂	1 剂	1 剂	1 剂							
轮状病毒 (RV)		1 剂	1 剂	1 剂 (1)									
麻疹、腮腺炎、风疹 (MMR)					1 剂	1 剂			1 剂				
水痘 (VAR)					1 剂	1 剂			1 剂				
甲型肝炎 (HepA)					2 剂 (6)	2 剂 (6)	2 剂 (6)	2 剂 (6)	2 剂 (6)	2 剂 (6)	2 剂 (6)	2 剂 (6)	2 剂 (6)
人乳头瘤病毒 (HPV)											2 剂 (3)		
脑膜炎球菌 A、C、W、Y (Men-ACWY)											1 剂		1 剂
B 型脑膜炎球菌 (MenB)													2 剂 (4,5)
流感 (Flu)				1 剂 (7)	1 剂 (7)	1 剂 (7)	1 剂 (7)	1 剂 (7)	1 剂 (7)				

建议 5 岁及以上儿童接种 COVID-19 疫苗。
与您孩子的医疗保健提供者讨论针对其年龄推荐的疫苗。

脚注:

1. 您的孩子可能不需要接种这一剂, 具体取决于您的医疗保健提供者使用的疫苗品牌。
2. 如果距上一剂已 6 个月, 则这一剂 DTaP 最早可在 12 个月大时接种。
3. 患有某些疾病的儿童将需要接种第三剂。
4. 健康的青少年可以接种此疫苗。也建议有某些健康状况的青少年接种。
5. 根据您的医疗保健提供者的建议, 您的青少年可能需要额外的剂量。
6. 通常在 12-23 个月大时接种 2 剂, 间隔 6 个月。也建议用于以前未接种过疫苗的的儿童和青少年接种 HepA 疫苗 (2 剂)。
7. 每年秋季或冬季, 所有 6 个月及以上的人接种一剂。一些 9 岁以下的儿童需要 2 剂; 如果您的孩子需要超过 1 剂, 请咨询您孩子的医疗保健提供者。

