

Calendrier de vaccination recommandé pour les enfants par groupe d'âge, États-Unis, 2022

Vaccin	à la naissance (dans les 24 heures)	2 mois	4 mois	6 mois	12 mois	15 mois	18 mois	19-23 mois	4-6 ans	7-10 ans	11-12 ans	13-15 ans	16-18 ans
Hépatite B (HepB)	1 dose	1 dose	1 dose (1)	1 dose	1 dose	1 dose	1 dose						
Diphtérie, tétanos, coqueluche (DTaP/Tdap)		1 dose	1 dose	1 dose	1 dose (2)	1 dose (2)	1 dose (2)		1 dose		1 dose (Tdap)		
Haemophilus influenzae type b (Hib)		1 dose	1 dose	1 dose (1)	1 dose	1 dose							
Polio (IPV)		1 dose	1 dose	1 dose	1 dose	1 dose	1 dose		1 dose				
Pneumocoque conjugué (PCV13)		1 dose	1 dose	1 dose	1 dose	1 dose							
Rotavirus (RV)		1 dose	1 dose	1 dose (1)									
Rougeole, oreillons, rubéole (ROR)					1 dose	1 dose			1 dose				
Varicelle (VAR)					1 dose	1 dose			1 dose				
Hépatite A (HepA)					2 doses (6)	2 doses (6)	2 doses (6)	2 doses (6)	2 doses (6)	2 doses (6)	2 doses (6)	2 doses (6)	2 doses (6)
Virus du papillome humain (VPH)											2 doses (3)		
Méningocoque A, C, W, Y (Men-ACWY)											1 dose		1 dose
Méningocoque B (MenB)													2 doses (4, 5)
Influenza (grippe)				1 dose (7)	1 dose (7)	1 dose (7)	1 dose (7)	1 dose (7)	1 dose (7)	1 dose (7)	1 dose (7)	1 dose (7)	1 dose (7)

La vaccination contre le COVID-19 est recommandée pour les personnes âgées de 5 ans et plus.
Demandez au prestataire de soins de santé de votre enfant quels sont les vaccins recommandés pour son âge.

Notes de bas de page :

1. Selon le vaccin utilisé par votre prestataire de soins, votre enfant peut ne pas avoir besoin de cette dose .
2. Cette dose de DTaP peut être administrée dès l'âge de 12 mois à condition que 6 mois se soient écoulés depuis la dose précédente.
3. Les enfants souffrant de certains troubles médicaux auront besoin d'une troisième dose.
4. Ce vaccin peut être administré aux adolescents en bonne santé. Il est également recommandé pour les adolescents présentant certains problèmes de santé.
5. Votre adolescent peut avoir besoin d'une dose supplémentaire, selon la recommandation de votre prestataire de soins.
6. 2 doses administrées à 6 mois d'intervalle de façon systématique à l'âge de 12 à 23 mois. Le vaccin HepA (2 doses) est également recommandé pour les enfants et les adolescents qui n'ont pas été vaccinés auparavant.
7. Une dose chaque automne ou hiver à toutes les personnes âgées de 6 mois et plus. Certains enfants de moins de 9 ans ont besoin de 2 doses ; demandez au prestataire de soins de santé de votre enfant s'il a besoin de plus d'une dose.

